

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(Tél.: 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C. C. P., MONTPELLIER 5.253.57

: 15 francs

N° 45 - JUIN 1964

6° supplément

AUDE - HÉRAULT - GARD -
PYRÉNÉES ORIENTALES

ARBORICULTURE FRUITIÈRE

TAVELURE DU POIRIER ET DU POMMIER (avertissement)

Le traitement préconisé n'assure plus la protection en raison du développement de la végétation; Des contaminations nouvelles sont possibles lors des pluies d'orage probables. Ce traitement est particulièrement nécessaire dans les cultures de l'Hérault et du Gard où la maladie se manifeste presque dans tous les vergers. Traiter dès réception du présent avis.

CARPOCAPSE (Information)

Une recrudescence des norties de papillons est observée, il faut absolument assurer la protection permanente des fruits. Utiliser sur poirier un insecticide efficace contre la Tordeuse orientale.

PSYLES DU POIRIER (Information)

Des pullulations de Psyles sont observées dans de nombreux vergers de poiriers. Appliquer avec soin :

Azinphos
Diazinon
Parathion éthyle
Parathion méthyle

EULIA PULCHELLANA SUR POMMIER (Information)

Une génération de chenilles est responsable de dégâts sur pommes dans la région de Mauguio Lansargues, Candillargues (Hérault). On préviendra ces dégâts en appliquant (traitement abondant) un insecticide à base de Parathion méthyle ou de Mevinphos.

Les Contrôleurs,

L.L.TROUILLON M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

DLP 25-6-64 312323

P108

1964
30

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS
VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de MONTPELLIER

Montpellier le 19 Juin 1964

NOTE - N° 10

E U D E M I S

Le vol de deuxième génération d'eudémis a repris à Banyuls dels Aspres, il est très important à Canohès, Poïlestres (Pyrénées-Orientales).

Dans l'Hérault, il se développe à Montpellier-Grammont, St-Georges d'Orques.

Le traitement préventif à base de D.D.T. ou de Roténone qui s'y rapporte est à effectuer dès le 21 juin ; on renouvelera l'opération une dizaine de jours après.

Les traitements curatifs aux esters phosphoriques ne sont applicables qu'au moment de l'apparition des premiers dégâts.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles :

G BERNON